

Her kan du lese om kreft i livmorhalsen, og om hvordan vaksinen Gardasil® kan beskytte deg.

- Hvert år får ca. 300 norske kvinner kreft i livmorhalsen.
- Ca. 80 av disse kvinnene dør hvert år.
- Kvinnene får kreften av et virus som de blir smittet av når de har sex.
- Du kan nå beskytte deg mot viruset ved å vaksinere deg.

DETTE ER LIVMORHALSKREFT

I kvinnekroppen finnes livmoren, der fosteret vokser. Livmorhalsen sitter i åpningen av livmoren. Hvis cellene i livmorhalsen forandres, kan det føre til sykdommen kreft.

HVOR MANGE KVINNER FÅR LIVMORHALSKREFT?

I Norge får ca. 300 kvinner livmorhalskreft hvert år. Ca. 80 kvinner dør hvert år av sykdommen. Alle kvinner kan bli smittet av et virus som gir celleforandringer, som senere kan føre til kreft. Men det er bare noen kvinner som får kreft av viruset. Siden ingen kan vite hvilke kvinner som får kreft av viruset, er det best at alle kvinner beskytter seg mot det.

VIRUSET

Viruset heter humant papillomavirus, som forkortes HPV. Det finnes flere enn 100 typer HPV, og de fleste er ufarlige. Noen HPV-typer kan gjøre at cellene i kroppen forandrer seg. Celleforandringer kan iblant føre til kreft.

CELLEPRØVE

Den eneste måten å vite om cellene i livmorhalsen er forandret, er ved å ta en celleprøve. Du tar en celleprøve hos en gynekolog, hvert 3. år i alderen 26-69 år. Alle voksne kvinner i Norge blir innkalt til celleprøve. Da er det viktig at du går. Hvis celleprøven viser at du har celleforandringer, kan legen gi deg behandling før de utvikler seg til kreft.

VAKSINASJON BESKYTTER MOT SMITTE

Kvinner som vaksinerer seg med Gardasil®, kan få beskyttelse mot smitte av HPV. Gardasil® beskytter de fleste kvinner, som ikke allerede er smittet av HPV-typer. Du må ta tre sprøyter når du vaksinerer deg. Du må ta den andre sprøyten 1 måned etter den første sprøyten. Du må ta den tredje og siste sprøyten når det har gått 3 måneder etter den andre sprøyten. Sprøytene settes i overarmen.



GJØR SLIK:

- Gå til fastlegen eller en vaksinasjonsklinikk.
- Du får resept på Gardasil®.
- Gå på apoteket og hent Gardasil®.
- Bestill tid hos fastlegen eller vaksinasjonsklinikken.
- Personalet vil så gi deg sprøytene med vaksinen.

BIVIRKNINGER

I likhet med andre vaksiner kan også Gardasil® gi bivirkninger. De vanligste er rødhet, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet, samt feber.

SÅ MYE KOSTER VAKSINEN

En vaksinasjon, som består av tre sprøyter, koster kr 3512,40. Når personalet gir vaksinen kan det også koste noe, spør når du bestiller time. Jenter på 12 og 13 år kan vaksinere seg gratis i skolevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009.

VIKTIG INFORMASJON!

Gravide skal ikke vaksinere seg. Du må ikke vaksinere deg hvis du har høy feber eller hvis du blir syk av de stoffene som finnes i Gardasil®.

HAR DU SPØRSMÅL?

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med helsesenteret, en lege eller personalet på en vaksinasjonsklinikk. Du kan også ringe til oss på telefonnummer +47 67 50 50 20. Du kan sende e-post til infono@spmsd.com.

HVA ER GARDASIL®?

Gardasil® er en vaksine mot fire forskjellige typer av humant papillomavirus. Vaksinen Gardasil® settes i overarmen tre ganger i løpet av et år. Det er ikke alle som blir beskyttet av vaksinen; vaksinen gir kun beskyttelse mot de HPV-typer som finnes i vaksinen. Hvis du allerede har viruset, vil heller ikke vaksinen beskytte deg. Det er viktig også å ta celleprøve regelmessig.

Gardasil® er en vaksine mot humant papillomavirus (type 6, 11, 16 og 18). Vaksinen gis som injeksjonsvæske i overarmen som tre doser i løpet av et år. Indikasjonen er basert på påvist effekt av Gardasil® hos voksne kvinner mellom 16 og 26 år og påvist immunogenisitet av Gardasil® hos 9 til 15 år gamle barn og ungdommer. Som med alle vaksiner er det ikke sikkert at vaksinasjon med Gardasil® gir tiltenkt beskyttelseeffekt hos alle individer. Husk at Gardasil® ikke beskytter mot alle typer humant papillomavirus, og vaksinen beskytter heller ikke mot en pågående virusinfeksjon. Gardasil® kan ikke forårsake de sykdommene vaksinen beskytter mot. Det er viktig å fortsette å gå til de gynekologiske celleprøvetakingene man blir innkalt til, og fortsatt beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer. For mer informasjon om bruk, advarsler, begrensninger og priser se: www.felleskatalogen.no